

和歌山県の外来種リスト 鳥類

| No | 目名 | 種名 | | カテゴリー | 定着段階 | 外来生物 法区分 | 国リスト区 分 | 評価項目 | | | | | | | | | | 由来 | | 主な原産地 | 県内の分布 | 生息環境 | 備考 | |
|----|------|------------|---|-------|---------------|-------------|---------------------|-------|----|----|----|------|----|------|------|------|---------|------|----|-------|-----------------------------|--|-------------------|---|
| | | 和名 | 学名 | | | | | 生態系被害 | | | | 分布拡大 | | 重要地域 | 社会被害 | | 人間による拡散 | | 国外 | | | | | 国内 |
| | | | | | | | | 競争 | 交雑 | 捕食 | 変容 | 繁殖 | 気候 | | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | | | | | | |
| 1 | キジ目 | コジュケイ | <i>Bambusicola thoracicus</i> (Temminck, 1815) | | 分布拡大～ まん延 | | | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | 中国南部 | 県内全市町村 | 森林、里地 | 1919年以降、全国各地で放鳥された。県内に侵入した時期は不明。県内各 地で繁殖している。 |
| 2 | カモ目 | コブハクチョウ | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789) | | 定着初期/ 限定分布 | | その他の 総合対策 外来種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ユーラシア大陸 | 紀の川、有田川、 広川、すさみ湾で 記録されている | 湖沼、内湾 | 国内に野生化した個体群があり、そこから移動してきた個体が確認される。 代表的な繁殖地はウトナイ湖で、越冬地は霧ヶ浦。2005年から2010年ま で、ガンカモ調査によってすさみ湾で確認されている。 |
| 3 | カモ目 | コクチョウ | <i>Cygnus atratus</i> (Latham, 1790) | | 定着初期/ 限定分布 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オーストラリア | 2019年1月現在、 紀の川市貴志川 町の平池で生息 している | 湖沼、内湾 | 国内に野生化した個体群があり、そこから移動してきた個体が確認される。 代表的な繁殖地は千波湖(茨城県)。2017年11月に紀の川市貴志川町の 平池で確認され、2019年1月現在も生息している。 |
| 4 | ハト目 | カワラバト(ドバト) | <i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789) | | 分布拡大～ まん延 | | | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ユーラシア大 陸、アフリカ北 部 | 県内全市町村 | 市街地、農耕地 | 県内各地の市街地や農耕地で、多数繁殖している。 |
| 5 | スズメ目 | ソウシチョウ | <i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli, 1786) | | 分布拡大～ まん延 | 特定外来 生物 | 重点対策 外来種 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 中国南部～ベト ナム北部～ミヤ ンマー北部 | 県内の山地帯 全域 | 森林(特に落葉 広葉樹林帯) | 1990年頃から県内で確認されるようになり、落葉広葉樹林帯で多数繁殖す るようになった。2000年代後半より、シカの食害のためササ類などの下草 が減少するとともに、個体数も減少している。 |