

症状

| 発現割合 | mRNAワクチン | | | | 組換えタンパクワクチン |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | ファイザー社 | モデルナ社 | 第一三共社 | Meiji Seika ファルマ社 | 武田薬品工業社 |
| | 50%以上 | 痛み ^{*1} 、疲労、頭痛 | 痛み ^{*1} 、疲労、頭痛 | 痛み ^{*1} 、倦怠感 | 痛み ^{*1} |
| 10～50% | 筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱、下痢、腫れ ^{*1} | 筋肉痛、悪寒、関節痛、吐き気・嘔吐、リンパ節の腫れや痛み、発熱、腫れ ^{*1} 、しこり ^{*1} 、赤み ^{*1} | 熱感 ^{*1} 、腫れ ^{*1} 、赤み ^{*1} 、かゆみ ^{*1} 、しこり ^{*1} 、頭痛、発熱、筋肉痛 | 倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛、発熱、めまい、腫れ ^{*1} 、しこり ^{*1} 、赤み ^{*1} | 倦怠感、関節痛、吐き気・嘔吐 |
| 1～10% | 赤み ^{*1} 、リンパ節の腫れや痛み、嘔吐、疼痛 | 痛み ^{*2} 、腫れ ^{*2} 、赤み等 ^{*2} | 赤み ^{*2} 、腫れ ^{*2} 、かゆみ ^{*2} 、熱感 ^{*2} 、しこり ^{*2} 、痛み ^{*2} 、リンパ節の腫れや痛み、発疹、腋の痛み | かゆみ ^{*1} 、下痢、吐き気、嘔吐 | 腫れ ^{*1} 、しこり ^{*1} 、赤み ^{*1} 、発熱、四肢痛 |

各社の添付文書より厚労省において作成

※1ワクチンを接種した部位の症状

※2接種後7日以降に現れる、ワクチンを接種した部位の症状

