

針刺し後のH I V 感染防止体制

配置薬

Raltegravir(アイセントレス®;RAL)

Truvada(ツルバダ®;TVD)

針刺し後のHIV感染防止体制整備に係る配置医療機関MAP



【配置医療機関一覧】


①和歌山県立医科大学附属病院 和歌山市紀三井寺 8 1 1 - 1 (TEL 073-447-2300)	⑤公立那賀病院 紀の川市打田 1 2 8 2 (TEL 0736-77-2019)
②独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 田辺市たきない町 2 7 - 1 (TEL 0739-26-7050)	⑥和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 かつらぎ町妙寺 2 1 9 (TEL 0736-22-0066)
③日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山市小松原通 4 丁目 20 (TEL 073-422-4171)	⑦有田市立病院 有田市宮崎町 6 (TEL 0737-82-2151)
④新宮市立医療センター 新宮市蜂伏 1 8 - 7 (TEL 0735-31-3333)	⑧ひだか病院 御坊市菌 1 1 6 - 2 (TEL 0738-22-1111)

血液・体液曝露事故（針刺し事故） 発生時緊急対応フローチャート



和歌山県ホームページ
「エイズ」で検索

できるだけ早く



- ①抗HIV薬内服同意書(別紙2)
- ②抗HIV薬予防投与依頼書(別紙3)
- ③処方箋(写し)

※針刺し後のHIV感染防止体制整備に係る配置医療機関(別紙)

- ①抗HIV薬内服同意書(別紙2)
- ②抗HIV薬予防投与依頼書(別紙3)
- ③処方箋(写し)

- 【エイズ治療拠点病院】
- ①和歌山県立医科大学(中核拠点病院)
 - ②南和歌山医療センター
 - ③日赤和歌山医療センター

一般医療機関

配置医療機関

専門医