

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その1)

		悪性新生物			心疾患			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和4年	和歌山県 全 国	3,341 385,797	372.9 316.1	10	2,277 232,964	254.1 190.9	6	759 74,013	84.7 60.7	10
3年	和歌山県 全 国	3,297 381,505	363.5 310.7	11	2,080 214,710	229.3 174.9	8	713 73,194	78.6 59.6	11
2年	和歌山県 全 国	3,296 378,385	359.8 306.6	9	2,094 205,596	228.6 166.6	4	812 78,450	88.6 63.6	9
元年	和歌山県 全 国	3,305 376,245	360.0 304.2	12	2,278 207,714	248.1 167.9	1	996 95,518	108.5 77.2	6
平成30年	和歌山県 全 国	3,319 373,584	357.3 300.7	10	2,250 208,221	242.2 167.6	3	998 94,661	107.4 76.2	6
29年	和歌山県 全 国	3,287 <u>373,365</u>	350.1 299.5	10	2,205 <u>204,868</u>	234.8 <u>164.4</u>	4	1,089 <u>96,859</u>	116.0 77.7	5
28年	和歌山県 全 国	3,329 <u>373,088</u>	350.8 <u>298.4</u>	10	2,107 <u>198,070</u>	222.0 158.4	4	1,202 <u>119,346</u>	126.7 <u>95.5</u>	9
27年	和歌山県 全 国	3,405 <u>370,362</u>	355.1 295.5	9	2,090 <u>196,127</u>	218.0 156.5	4	1,267 <u>120,959</u>	132.1 96.5	8
26年	和歌山県 全 国	3,406 <u>368,106</u>	352.2 293.5	7	2,239 <u>196,931</u>	231.5 157.0	3	1,308 <u>119,652</u>	135.3 95.4	5
25年	和歌山県 全 国	3,451 <u>364,873</u>	353.9 290.3	6	2,304 196,723	236.3 156.5	3	1,356 122,969	139.1 97.8	7
24年	和歌山県 全 国	3,394 <u>360,963</u>	345.3 286.6	6	2,206 198,836	224.4 157.9	3	1,319 123,925	134.2 98.4	7
23年	和歌山県 全 国	3,457 <u>357,306</u>	349.2 283.2	5	2,140 194,926	216.2 154.5	5	1,222 124,749	123.4 98.9	17
22年	和歌山県 全 国	3,440 353,499	344.9 279.7	4	2,019 <u>189,361</u>	202.4 149.8	7	1,274 118,888	127.7 94.1	7

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その1)

	悪性新生物		心疾患		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	460.0	1 山口県	272.4	1 山口県	107.8
	2 青森県	421.6	2 愛媛県	266.4	2 高知県	105.4
	3 北海道	399.0	3 高知県	259.6	3 徳島県	99.3
低 率	45 滋賀県	271.4	45 福岡県	144.5	45 神奈川県	41.6
	46 東京都	258.9	46 沖縄県	138.0	46 滋賀県	39.4
	47 沖縄県	239.4	47 愛知県	132.5	47 沖縄県	37.3

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その2)

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和4年	和歌山県 全 国	859 107,481	95.9 88.1	26	1,968 179,529	219.6 147.1	2	435 43,420	48.5 35.6	12
令和3年	和歌山県 全 国	774 104,595	85.3 85.2	33	1,620 152,027	178.6 123.8	7	428 38,355	47.2 31.2	5
2年	和歌山県 全 国	808 102,978	88.2 83.5	29	1,476 132,440	161.1 107.3	5	357 38,133	39.0 30.9	19
元年	和歌山県 全 国	795 106,552	86.6 86.1	33	1,367 121,863	147.8 98.5	7	399 39,184	43.5 31.7	10
平成30年	和歌山県 全 国	835 108,186	89.9 87.1	34	1,236 109,605	133.0 88.2	8	425 41,238	45.7 33.2	9
29年	和歌山県 全 国	895 <u>109,896</u>	95.3 88.2	30	1,184 <u>101,411</u>	126.1 <u>81.4</u>	7	406 <u>40,332</u>	43.2 32.4	14
28年	和歌山県 全 国	925 <u>109,353</u>	97.5 <u>87.5</u>	30	1,080 <u>92,836</u>	113.8 <u>74.3</u>	6	340 <u>38,314</u>	35.8 30.6	26
27年	和歌山県 全 国	942 <u>111,974</u>	98.2 89.4	29	989 <u>84,819</u>	103.1 67.7	8	336 <u>38,310</u>	35.0 30.6	27
26年	和歌山県 全 国	1,044 <u>114,209</u>	108.0 91.1	20	906 <u>75,391</u>	93.7 60.1	6	359 <u>39,030</u>	37.1 31.1	26
25年	和歌山県 全 国	1,037 118,347	106.4 94.1	24	818 69,720	83.9 55.5	9	381 39,574	39.1 31.5	20
24年	和歌山県 全 国	1,025 121,602	104.3 96.5	30	740 60,719	75.3 48.2	8	398 41,031	40.5 32.6	20
23年	和歌山県 全 国	996 123,867	100.6 98.2	32	709 52,242	71.6 41.4	3	445 59,416	44.9 47.1	12
22年	和歌山県 全 国	1,060 123,461	106.3 97.7	28	638 45,342	64.0 35.9	4	391 40,732	39.2 32.2	21

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その2)

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	169.9	1 山形県	237.5	1 富山県	56.4
	2 岩手県	165.2	2 和歌山県	219.6	2 愛媛県	54.0
	3 山形県	133.4	3 三重県	215.8	3 秋田県	52.3
低 率	45 愛知県	69.4	45 埼玉県	118.3	45 埼玉県	26.3
	46 東京都	66.9	46 大阪府	107.4	46 京都府	24.3
	47 滋賀県	66.4	47 福岡県	101.1	47 沖縄県	21.9

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その3)

		誤嚥性肺炎			腎不全			慢性閉塞性肺疾患		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和4年	和歌山県 全 国	516 56,069	57.6 45.9	11	339 30,739	37.8 25.2	4	161 16,676	18.0 13.7	5
令和3年	和歌山県 全 国	483 49,488	53.3 40.3	8	290 28,688	32.0 23.4	8	148 16,384	16.3 13.3	14
2年	和歌山県 全 国	440 42,746	48.0 34.6	7	288 26,948	31.4 21.8	7	164 16,125	17.9 13.1	6
元年	和歌山県 全 国	418 40,385	45.5 32.6	8	298 26,644	32.5 21.5	5	195 17,836	21.2 14.4	1
平成30年	和歌山県 全 国	424 38,460	45.6 31.0	5	263 26,081	28.3 21.0	11	225 18,577	24.2 15.0	1
29年	和歌山県 全 国	376 <u>35,791</u>	40.0 28.7	9	259 <u>25,135</u>	27.6 20.2	11	221 <u>18,528</u>	23.5 14.9	3
28年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	279 <u>24,620</u>	29.4 19.7	8	195 <u>15,692</u>	20.5 <u>12.6</u>	1
27年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	278 <u>24,561</u>	29.0 19.6	3	193 15,756	20.1 12.6	2
26年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	285 24,776	29.5 19.8	4	185 16,184	19.1 12.9	4
25年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	287 25,101	29.4 20.0	5	210 16,443	21.5 13.1	2
24年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	284 25,107	28.9 19.9	4	211 16,402	21.5 13.0	1
23年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	285 24,526	28.8 19.4	5	208 16,639	21.0 13.2	2
22年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	259 23,725	26.0 18.8	9	194 16,293	19.5 12.9	2

注1：順位は高率からみた全国順位

注2：「誤嚥性肺炎」は平成29年より死因順位に用いる分類項目に追加しているため、平成28年以前の順位はつけていない。

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

令和4年

(その3)

	誤嚥性肺炎		腎不全		慢性閉塞性肺疾患	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 香川県	88.3	1 高知県	46.2	1 徳島県	19.8
	2 徳島県	71.5	2 青森県	42.6	2 山口県	18.8
	3 熊本県	69.0	3 山口県	38.1	3 大分県	18.6
低 率	45 埼玉県	33.3	45 千葉県	19.2	45 宮城県	11.1
	46 栃木県	33.1	46 東京都	17.5	46 沖縄都	10.5
	47 沖縄県	31.8	47 神奈川県	17.3	47 愛知県	10.1

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。