

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

		悪性新生物			心 疾 患			肺 炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和5年	和歌山県	3,286	371.7	10	2,432	275.1	3	841	95.1	5
	全 国	382,504	315.6		231,148	190.7		75,753	62.5	
4年	和歌山県	3,341	372.9	10	2,277	254.1	6	759	84.7	10
	全 国	385,797	316.1		232,964	190.9		74,013	60.7	
3年	和歌山県	3,297	363.5	11	2,080	229.3	8	713	78.6	11
	全 国	381,505	310.7		214,710	174.9		73,194	59.6	
2年	和歌山県	3,296	359.8	9	2,094	228.6	4	812	88.6	9
	全 国	378,385	306.6		205,596	166.6		78,450	63.6	
元年	和歌山県	3,305	360.0	12	2,278	248.1	1	996	108.5	6
	全 国	376,245	304.2		207,714	167.9		95,518	77.2	
平成30年	和歌山県	3,319	357.3	10	2,250	242.2	3	998	107.4	6
	全 国	373,584	300.7		208,221	167.6		94,661	76.2	
29年	和歌山県	3,287	350.1	10	2,205	234.8	4	1,089	116.0	5
	全 国	373,365	299.5		204,868	164.4		96,859	77.7	
28年	和歌山県	3,329	350.8	10	2,107	222.0	4	1,202	126.7	9
	全 国	373,088	298.4		198,070	158.4		119,346	95.5	
27年	和歌山県	3,405	355.1	9	2,090	218.0	4	1,267	132.1	8
	全 国	370,362	295.5		196,127	156.5		120,959	96.5	
26年	和歌山県	3,406	352.2	7	2,239	231.5	3	1,308	135.3	5
	全 国	368,106	293.5		196,931	157.0		119,652	95.4	
25年	和歌山県	3,451	353.9	6	2,304	236.3	3	1,356	139.1	7
	全 国	364,873	290.3		196,723	156.5		122,969	97.8	
24年	和歌山県	3,394	345.3	6	2,206	224.4	3	1,319	134.2	7
	全 国	360,963	286.6		198,836	157.9		123,925	98.4	
23年	和歌山県	3,457	349.2	5	2,140	216.2	5	1,222	123.4	17
	全 国	357,306	283.2		194,926	154.5		124,749	98.9	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その1）

	悪性新生物		心 疾 患		肺 炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	437.5	1 山口県	284.2	1 青森県	110.0
	2 青森県	429.5	2 愛媛県	275.5	2 山口県	108.4
	3 北海道	403.4	3 和歌山県	275.1	3 高知県	103.2
低 率	45 滋賀県	269.0	45 福岡県	144.2	45 滋賀県	43.0
	46 東京都	254.9	46 沖縄県	137.0	46 神奈川県	42.1
	47 沖縄県	235.9	47 愛知県	130.8	47 沖縄県	38.0

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その2）

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和5年	和歌山県	829	93.8	28	1,993	225.5	3	447	50.6	9
	全 国	104,533	86.3		189,919	156.7		44,440	36.7	
4年	和歌山県	859	95.9	26	1,968	219.6	2	435	48.5	12
	全 国	107,481	88.1		179,529	147.1		43,420	35.6	
3年	和歌山県	774	85.3	33	1,620	178.6	7	428	47.2	5
	全 国	104,595	85.2		152,027	123.8		38,355	31.2	
2年	和歌山県	808	88.2	29	1,476	161.1	5	357	39.0	19
	全 国	102,978	83.5		132,440	107.3		38,133	30.9	
元年	和歌山県	795	86.6	33	1,367	147.8	7	399	43.5	10
	全 国	106,552	86.1		121,863	98.5		39,184	31.7	
平成30年	和歌山県	835	89.9	34	1,236	133.0	8	425	45.7	9
	全 国	108,186	87.1		109,605	88.2		41,238	33.2	
29年	和歌山県	895	95.3	30	1,184	126.1	7	406	43.2	14
	全 国	109,896	88.2		101,411	81.4		40,332	32.4	
28年	和歌山県	925	97.5	30	1,080	113.8	6	340	35.8	26
	全 国	109,353	87.5		92,836	74.3		38,314	30.6	
27年	和歌山県	942	98.2	29	989	103.1	8	336	35.0	27
	全 国	111,974	89.4		84,819	67.7		38,310	30.6	
26年	和歌山県	1,044	108.0	20	906	93.7	6	359	37.1	26
	全 国	114,209	91.1		75,391	60.1		39,030	31.1	
25年	和歌山県	1,037	106.4	24	818	83.9	9	381	39.1	20
	全 国	118,347	94.1		69,720	55.5		39,574	31.5	
24年	和歌山県	1,025	104.3	30	740	75.3	8	398	40.5	20
	全 国	121,602	96.5		60,719	48.2		41,031	32.6	
23年	和歌山県	996	100.6	32	709	71.6	3	445	44.9	12
	全 国	123,867	98.2		52,242	41.4		59,416	47.1	

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その2）

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	173.4	1 山形県	263.3	1 青森県	61.1
	2 岩手県	160.8	2 秋田県	233.3	2 秋田県	59.0
	3 新潟県	129.3	3 和歌山県	225.5	3 富山県	56.9
低 率	45 大阪府	67.2	45 滋賀県	123.8	45 埼玉県	26.4
	46 東京都	64.8	46 大阪府	117.6	46 千葉県	26.4
	47 滋賀県	62.7	47 福岡県	110.2	47 沖縄県	20.6

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

		誤嚥性肺炎			腎不全		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和5年	和歌山県	575	65.0	7	313	35.4	9
	全 国	60,190	49.7		30,208	24.9	
4年	和歌山県	516	57.6	11	339	37.8	4
	全 国	56,069	45.9		30,739	25.2	
3年	和歌山県	483	53.3	8	290	32.0	8
	全 国	49,488	40.3		28,688	23.4	
2年	和歌山県	440	48.0	7	288	31.4	7
	全 国	42,746	34.6		26,948	21.8	
元年	和歌山県	418	45.5	8	298	32.5	5
	全 国	40,385	32.6		26,644	21.5	
平成30年	和歌山県	424	45.6	5	263	28.3	11
	全 国	38,460	31.0		26,081	21.0	
29年	和歌山県	376	40.0	9	259	27.6	11
	全 国	35,791	28.7		25,135	20.2	
28年	和歌山県	—	—	—	279	29.4	8
	全 国	—	—		24,620	19.7	
27年	和歌山県	—	—	—	278	29.0	3
	全 国	—	—		24,561	19.6	
26年	和歌山県	—	—	—	285	29.5	4
	全 国	—	—		24,776	19.8	
25年	和歌山県	—	—	—	287	29.4	5
	全 国	—	—		25,101	20.0	
24年	和歌山県	—	—	—	284	28.9	4
	全 国	—	—		25,107	19.9	
23年	和歌山県	—	—	—	285	28.8	5
	全 国	—	—		24,526	19.4	

注1：順位は高率からみた全国順位

注2：「誤嚥性肺炎」は平成29年より死因順位に用いる分類項目に追加しているため、平成28年以前の順位はつけていない。

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その3）

	誤嚥性肺炎		腎 不 全	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 香川県	101.8	1 高知県	45.2
	2 徳島県	78.5	2 青森県	40.8
	3 熊本県	71.1	3 徳島県	40.4
低 率	45 東京都	37.5	45 愛知県	19.3
	46 埼玉県	37.4	46 東京都	17.5
	47 沖縄県	34.2	47 神奈川県	17.3

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。