

沿岸水温の月別平年偏差(プラス・マイナス)

2020年1～12月

| 海 域 | 水深 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|-------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|----|-----|-----|----------|
| 紀伊水道内部 (WS1～WS15') 15測点 | 観測日 | | 2/3,4 | 3/25,26 | 4/15,16 | 5/20,21 | 6/16,17 | 7/30,31 | 8/4,5 | | | | |
| | 0m | | ++ | + | +- | +- | ++ | +++ | - | | | | |
| | 30m | | ++ | + | +- | -+ | - | -- | -- | | | | |
| | 50m | | ++ | + | + | +- | - | -- | +++ | | | | |
| 紀伊水道外域 (WE13～WE15) 3測点 | 観測日 | | 2/4 | 3/26 | 4/15 | 5/21 | 6/16 | 7/30 | 8/4 | | | | |
| | 0m | | + | + | - | - | ++ | ++ | +- | | | | |
| | 30m | | + | +- | - | - | - | ---- | ---- | | | | |
| | 50m | | + | +- | - | - | - | -- | -- | | | | |
| 紀南沿岸域 (WE16～WE27) 12測点 | 観測日 | 1/14,16 | 2/20,28 | 3/3,9 | 4/8,9 | 5/21,25 | 6/9,6/17 | 7/2 | 8/5,6 | | | | 12/9,11 |
| | 0m | -+ | -+ | +- | - | +- | + | -- | + | | | | + |
| | 30m | -+ | -+ | -+ | - | -+ | - | ---- | ---- | | | | + |
| | 50m | +- | -+ | +- | - | -+ | - | ---- | ---- | | | | + |
| | 100m | +- | +- | + | +- | +- | -+ | - | - | | | | ++ |
| 200m | -+ | -+ | + | + | + | + | -+ | +- | | | | ++ | |
| 熊野灘南部 (WE28～WE36) 9測点 | 観測日 | 1/10 | 2/19 | 3/2 | 4/3 | 5/26 | 6/8 | 7/29 | 8/7 | | | | 12/10,18 |
| | 0m | + | + | + | -+ | +++ | +++ | + | +- | | | | ++ |
| | 30m | + | + | + | + | ++ | ++ | -+ | +- | | | | ++ |
| | 50m | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | +- | +- | | | | ++ |
| | 100m | -+ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | | | | +++ |
| 200m | - | + | +- | + | ++ | +++ | ++ | + | | | | ++ | |

*** 偏差の目安**

- +++ あるいは --- (± 2.5 °C 以上) かなり高め、かなり低め
- ++ あるいは -- (± 1.5 ~ 2.4 °C) 高め、低め
- + あるいは - (± 0.5 ~ 1.4 °C) やや高め、やや低め
- +- あるいは -+ (± 0.4 °C 以下) プラス基調、マイナス基調の平年並み

* 平年値は1981～2010年の30年間から算出。

※1月紀伊水道内部、外域は欠測

7月WE15、瀬戸崎～市江崎は欠測

9月～11月は欠測

12月紀伊水道内部、外域、WE20、WE21は欠測