

平成 23 年度病害虫発生予察注意報（第 5 号）

平成 23 年 9 月 15 日

和 歌 山 県

1. 病害虫名：果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ）
2. 対象作物：カンキツ
3. 発生地域：紀南地域
4. 発生量：多
5. 加害期間：9月中旬～
6. 注意報発令の根拠：
 - (1) 病害虫防除所みなべ駐在（みなべ町東本庄）に設置された予察灯でのチャバネアオカメムシの誘殺数は8月4半旬に193頭（前年243頭）であったが、8月5半旬に320頭（前年200頭）、8月6半旬に437頭（前年147頭）、9月1半旬に329頭（前年286頭）と多く、さらに台風12号接近後の9月2半旬に2140頭（前年242頭）と急増している（表1）。
 - (2) 病害虫防除所みなべ駐在（みなべ町東本庄）に設置された予察灯でのツヤアオカメムシの誘殺数は、8月4半旬に128頭（前年96頭）、8月5半旬に96頭（前年46頭）、8月6半旬に108頭（前年25頭）、9月1半旬に82頭（前年35頭）と多く、さらに台風12号接近後の9月2半旬に218頭（前年27頭）と急増している（表1）。
7. 防除上の注意事項
 - (1) 果樹カメムシ類の飛来量は地域やほ場により大きく異なる。このため、園内外を注意深く見回るとともに、各地域での発生状況に関する情報を収集しながら対応する。
 - (2) 山林隣接園や収穫の早い極早生温州で集中して加害される傾向があるので特に注意が必要である。
 - (3) 日没後に飛来して夜間に加害するため、夜間に観察して状況把握に努める。
 - (4) 薬剤防除は発生に応じて早めに行う。農薬の使用にあたっては、最新の登録情報（農林水産消費安全技術センターホームページ農薬登録情報提供システム：<http://acsearch.acis.famic.go.jp/famic/>）を参照し、使用基準を遵守する。

表1 みなべ町東本庄の予察灯における果樹カメムシ類の誘殺数(2011年)

誘殺日	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31
チャバネ	30	29	35	80	19	31	73	48	141	27	82	35	106	99	49	66
ツヤアオ	27	29	28	30	14	18	19	13	28	18	20	11	22	13	23	19
半旬	8月4半旬					8月5半旬					8月6半旬					
チャバネ	193					320					437					
ツヤアオ	128					96					108					

誘殺日	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11
チャバネ	69	0	3	167	90	10	75	593	623	839	300
ツヤアオ	14	0	1	60	7	2	6	53	68	89	25
半旬	9月1半旬					9月2半旬					
チャバネ	329					2140					
ツヤアオ	82					218					

注)チャバネ:チャバネアオカメムシ ツヤアオ:ツヤアオカメムシ

お問い合わせ
 和歌山県農作物病虫害防除所有田川駐在
 TEL : 0 7 3 7 - 5 2 - 4 3 2 0