

病害虫発生予報 第5号(8月予報)

和歌山県農作物病害虫防除所
TEL 0736(64)2300

<予報の概要>

作物名	病害虫名	発生量	作物名	病害虫名	発生量
水稻	いもち病 紋枯病 縞葉枯病 ヒメトビウンカ ツマグロヨコバイ セジロウンカ トビイロウンカ イチモンジセセリ コブノメイガ 斑点米カメムシ類	並 並 並 並 並 並 並 並 並 少		ミナミキイロアザミウマ ミカンキイロアザミウマ ハスモンヨトウ シロイチモジョトウ	やや少 並 並 やや多
	カンキツ			黒点病 かいよう病 ミカンハダニ ヤノネカイガラムシ チャノキイロアザミウマ ゴマダラカミキリ	やや少 並 並 やや少 やや少 並
	カキ		炭疽病 うどんこ病 円星落葉病 角斑落葉病 フジコナカイガラムシ	並 やや少 やや少 やや少 やや少	
トマト・ミニトマト	疫病 黄化葉巻病	やや少 やや多	果樹全般	カメムシ類	少
野菜全般	アブラムシ類 ハダニ類	並			

気象予報

1か月予報（予報期間 7月22日～8月21日 大阪管区気象台）

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

向こう1か月の平均気温は、高い確率50%です。降水量は、平年並または多い確率ともに40%です。日照時間は、平年並または少ない確率ともに40%です。

週別の気温は、1週目は、高い確率50%です。2週目は、平年並の確率50%です。3～4週目は、平年並または高い確率ともに40%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率（%）>



凡例: ■ 低い(少ない) ■ 平年並 ■ 高い(多い)

	月平均気温 (平年値) (°C)	月降水量 (平年値) (mm)
8月	和歌山 28.1	和歌山 86
	潮岬 26.7	潮岬 233

I . 水 稲

1. いもち病

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

- ① 県南部（田辺市以南）の早期栽培における7月中旬の葉いもちの発生は場率は0%（平年32%）であった。
- ② 県北部・中部の普通期栽培における7月中旬の葉いもちの発生は場率は17%（平年22%）であった。
- ③ 8月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 穂ばらみ期防除を重点とし、葉いもちの多発は場では穗ぞろい期に追加防除を行う。
- ② 常発地では翌年から罹病性品種の作付けを避ける。

2. 紋枯病

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

- ① 県南部（田辺市以南）の早期栽培における7月中旬の発生は場率は0%（平年8%）であった。
- ② 県北部・中部の普通期栽培における7月中旬の発生は場率は0%（平年5%）であった。
- ③ 8月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 穂ばらみ期に発病株率が20%以上のは場では、早急に薬剤防除を行う。
- ② 出穂後も上位葉への進展がみられる場合には追加防除を行う。

3. 編葉枯病

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

- ① 県南部（田辺市以南）の早期栽培における7月中旬の発病株率は0%（平年0.1%）であった。
- ② 県北部・中部の普通期栽培における7月中旬の発病株率は0%（平年0.2%）であった。
- ③ 媒介虫であるヒメトビウンカの8月の発生量は並と予想される。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① ヒメトビウンカの防除を行う。

4. ヒメトビウンカ

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

- ① 7月中旬の25株あたり生息密度は、県南部（田辺市以南）の早期栽培では7.7頭（平年8.2頭）、県北部・中部の普通期栽培では16.9頭（平年13.6頭）であった。
- ② 予察灯による7月1～20日の誘殺数は、紀の川市0頭（平年7.7頭）、上富田町1頭（平年0.6頭）、那智勝浦町51頭（平年1.6頭）であった。

5. ツマグロヨコバイ

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

- ① 7月中旬の25株あたり生息密度は、県南部（田辺市以南）の早期栽培では5.3頭（平年5.2頭）、県北部・中部の普通期栽培では3.0頭（平年2.7

頭）であった。

- ② 予察灯による7月1～20日の誘殺数は、紀の川市4頭（平年1.3頭）、上富田町14頭（平年28.6頭）、那智勝浦町123頭（平年260.4頭）であった。

6. セジロウンカ

- (1) 予報内容 発生量 やや少

- (2) 予報の根拠

① 7月中旬の25株あたり生息密度は、県南部（田辺市以南）の早期栽培では21.5頭（平年62.1頭）、県北部・中部の普通期栽培では18.3頭（平年43.4頭）であった。

② 予察灯による6月1日～7月20日の誘殺数は、紀の川市2頭（平年132.3頭）、上富田町4頭（平年105.4頭）、那智勝浦町31頭（平年96.7頭）であった。

7. トビイロウンカ

- (1) 予報内容 発生量 並

- (2) 予報の根拠

① 7月中旬の25株あたり生息密度は、県南部（田辺市以南）の早期栽培では0頭（平年0.1頭）、県北部・中部の普通期栽培では0頭（平年0.3頭）であった。

② 予察灯による6月1日～7月20日の誘殺数は、紀の川市0頭（平年1.0頭）、上富田町1頭（平年0.4頭）、那智勝浦町8頭（平年0.9頭）であった。

- (3) 防除上考慮すべき諸点

① 8月中旬の発生に注意し、株あたり成幼虫5頭以上の発生を認めた場合は薬剤散布を行う。

8. イチモンジセセリ(イネットムシ)

- (1) 予報内容 発生量 並

- (2) 予報の根拠

① 7月中旬の25株あたりツト数は、県南部（田辺市以南）の早期栽培では0（平年0.1）、県北部・中部の普通期栽培では0（平年0.1）であった。

- (3) 防除上考慮すべき諸点

① 8月上旬の発生に注意し、若齢期の防除に重点を置く。

9. コブノメイガ

- (1) 予報内容 発生量 並

- (2) 予報の根拠

① 7月中旬の25株あたり上位2葉の被害は、県南部（田辺市以南）の早期栽培では0葉（平年5.7葉）、県北部・中部の普通期栽培では0葉（平年0.4葉）であった。

② 蛍光灯誘殺箱（紀の川市）による6月14日～7月20日の誘殺数は0頭（平年1.7頭）であった。

- (3) 防除上考慮すべき諸点

① 第1世代の発蛾最盛期は7月下旬頃と思われる。

② 防除適期は、粒剤の場合は第1世代の発蛾最盛期、その他の薬剤（乳剤、水溶剤、フロアブル等）の場合は第2世代幼虫発生時期（第1世代の発蛾最盛期の7日後）である。

③ 幼穂形成期後、出穂期頃までに上位2葉の被害葉率が40%になると10%程度減収する。それ以降の被害は被害葉率80%以上でも収量・品質に及ぼす影響は小さいので、県南部の早期栽培では防除の必要性は低い。

10. 斑点米カメムシ類

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

- ① 県南部（田辺市以南）の早期栽培の本田における7月中旬の捕虫網20回振りによる捕獲虫数は7.6頭（平年5.0頭）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 出穂の早い作型で、周辺に雑草が繁茂していると被害を受けやすい。

- ② イネ科雑草が発生源となる。本田への成虫の飛来を防ぐためには、出穂10日前までには場周辺を除草する。

- ③ 出穂後、本田内でホソハリカメムシ、クモヘリカメムシ、シラホシカムシなどの飛来を認めたら、乳熟期（出穂10日後）から糊熟期（出穂20日後）に薬剤を散布する。カスミカメムシ類の発生が多い場合は穂ぞろい期（出穂3日後）に薬剤散布する。

II. 野 菜

<トマト・ミニトマト>

1. 疫病

(1) 予報内容 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

- ① 県中部の露地栽培ミニトマトにおける7月中旬の発生は場率は0%（過去9年の平均13%）であった。

- ② 8月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 排水を良くし、株元に滞水しないようにする。

- ② 露地栽培では、降雨前の予防散布に努める。降雨前に散布できなかった場合は降雨後に早急に防除する。

2. 黄化葉巻病

(1) 予報内容 発生量 やや多

(2) 予報の根拠

- ① 県中部の露地栽培ミニトマトにおける7月中旬の発生は場率は70%（過去4年の平均48%）であった。

- ② 8月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 施設栽培では育苗ほ、本ぼとも施設開口部へ目合い0.4mm以下の防虫ネットを展張し、媒介虫であるタバココナジラミの侵入を防止する。

- ② 定期的な薬剤散布に加え定植期の粒剤処理により、感染適期である育苗期から本ぼ初期のタバココナジラミ防除を徹底する。

<野菜全般>

1. アブラムシ類

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

- ① 県北部の露地栽培ナスにおける7月中旬の生息葉率は、ワタアブラムシ0.6%（平年0.5%）、モモアカアブラムシ0%（平年0.0%）であった。

- ② 黄色水盤（紀の川市）への7月1～20日までの飛来数は7頭（平年14.5頭）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① モモアカアブラムシ、ワタアブラムシは薬剤抵抗性の発達がみられるので、同一系統の薬剤の連用を避ける。

2. ハダニ類

- (1) 予報内容 発生量 並
- (2) 予報の根拠

① 県北部の露地栽培ナスにおける7月中旬の発生は場率および生息葉率は、カンザワハダニでそれぞれ29%（平年31%）、1.7%（平年10.0%）、ナミハダニでそれぞれ14%（平年12%）、1.7%（平年3.0%）であった。

- (3) 防除上考慮すべき諸点

① 薬剤抵抗性が発達している事例が多いので、同一系統の薬剤の連用を避ける。

3. ミナミキイロアザミウマ

- (1) 予報内容 発生量 やや少
- (2) 予報の根拠

① 県北部の露地栽培ナスにおける7月中旬の発生は場率は14%（平年27%）、生息葉率は0.6%（平年5.4%）であった。

- (3) 防除上考慮すべき諸点

① ナスでは、収穫果実の選別時に被害を認めたら防除を始める。
② 発生の多い場合は4～5日間隔で2回以上、薬剤を散布する。
③ 施設栽培では、栽培終了後に7～10日間ハウスの蒸し込みを行い、その後残さを処理し、後作の発生源にならないようにする。

4. ミカンキイロアザミウマ

- (1) 予報内容 発生量 並
- (2) 予報の根拠

① 県北部の露地栽培ナスにおける7月中旬の発生は場率は0%（平年：発生は場率1.8%、生息葉率0.1%）であった。

- (3) 防除上考慮すべき諸点

① ミナミキイロアザミウマに準ずる。

5. ハスマンヨトウ

- (1) 予報内容 発生量 並
- (2) 予報の根拠

① 県北部の露地栽培ナスにおける7月中旬の発生は場率は0%（平年：発生は場率6%、生息葉率0.3%）であった。

② フェロモントラップによる7月1～20日の誘殺数は、紀の川市9頭（平年39.0頭）、和歌山市74頭（過去6年の平均113.1頭）、御坊市176頭（平年183.2頭）、印南町98頭（平年75.9頭）であった。

- (3) 防除上考慮すべき諸点

① 幼虫が中～老齢期になると薬剤感受性が著しく低下するので、若齢期（ふ化幼虫の集団の食害による白変葉がみられたとき）の防除を心がける。
② 抑制栽培エンドウでは、ウイルス病、鳥害や防風対策を兼ねて、は種後40～50日間寒冷紗被覆を行うと被害が軽減される。

6. シロイチモジヨトウ

- (1) 予報内容 発生量 やや多
- (2) 予報の根拠

① フェロモントラップによる7月1～20日の誘殺数は、紀の川市43頭（平年6.9頭）、御坊市185頭（平年76.3頭）、印南町78頭（平年50.5頭）であった。

- (3) 防除上考慮すべき諸点

① ハスマンヨトウに準ずる。

III. 果 樹

<カンキツ>

1. 黒点病

(1) 予報内容 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

① 県北部（海南市下津町）、県中部、県南部（田辺市）における7月中旬の発生園率は11%（平年30%）、発病度は0.3（平年1.3）であった。

② 8月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 秋雨時期における後期感染防止のため、8月中下旬の防除を徹底する。

② 伝染源となる枯枝や剪定枝の処理を徹底する。

③ 過乾燥等で樹勢が低下すると枯枝が増えるおそれがあるので留意する。

2. かいよう病

(1) 予報内容 果実発生量 並

(2) 予報の根拠

① 県北部（海南市下津町）、県中部、県南部（田辺市）における7月中旬の春葉病斑の発生園率は20%（平年24%）、発病度は0.2（平年0.2）であった。

② 8月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 防風対策に努め、台風の接近等で強風雨が予想される場合には、事前に薬剤散布を行う。

② 夏秋梢の病斑は翌春の主要な伝染源になるので剪除に努める。幼木、高接樹ではミカンハモグリガの防除も徹底する。

3. ミカンハダニ

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

① 県北部（海南市下津町）、県中部、県南部（田辺市）における7月中旬の発生園率は41%（平年35%）、発生葉率は11.5%（平年8.7%）、100葉あたり雌成虫数は29.4頭（平年27.6頭）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 薬剤抵抗性が発達しやすいため、同一系統の薬剤を年間に2回以上使用しない。

4. ヤノネカイガラムシ

(1) 予報内容 発生時期 第2世代2齢幼虫最盛期 8月20～25日（平年並）
発生量 やや少

(2) 予報の根拠

① 予察ほ場（無防除、有田川町奥）での第1世代成虫の初発時期は平年並であった。

② 予察ほ場、各地域とも第1世代幼虫の発生量は平年よりやや少なかつた。

③ 8月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 発生園では8月中旬に、散布むらがなく葉裏までかかるように、十分量の薬液を丁寧に散布する。

5. チヤノキイロアザミウマ

(1) 予報内容 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

- ① 県北部（海南市下津町）、県中部、県南部（田辺市）における7月中旬の被害園率は16%（平年22%）、発生園率は0%（平年12%）であった。
- ② 予察ほ場（無防除、由良町）における黄色粘着トラップによる7月中旬の誘殺数は81頭（平年263頭）であった。
- ③ 8月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 地域での発生消長調査の結果により、適期防除に努める。
- ② 発生園およびイヌマキやサンゴジュの隣接園では防除を徹底する。

6. ゴマダラカミキリ

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

- ① 予察ほ場、各地域とも成虫の初発は平年より早かったが、6～7月の発生量は平年並であった。
- ② 発生源となる放任園や管理不良園が増加している。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 成虫の捕殺に努め、放任園周辺など発生の多い園では、産卵防止および食入幼虫対象の防除として薬剤を主幹から株元に散布する。

<カキ>

1. 炭疽病

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

- ① 県北部における7月中旬の発病果率は「富有」0.1%（平年0%）、「平核無」・「刀根早生」0%（平年0%）であった。
- ② 8月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 発病枝や発病果がみられる場合は剪除する。
- ② 台風が接近する場合は事前に薬剤を散布する。散布できなかつた園は台風通過後速やかに散布する。
- ③ 密植園や風通しの悪い場所は発病しやすいので、園内の通風・採光をはかり、薬液をかかりやすくする。

2. うどんこ病

(1) 予報内容 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

- ① 県北部における7月中旬の発生園率は「富有」71%（平年74%）、「平核無」・「刀根早生」12%（平年38%）であった。
- ② 県北部における7月中旬の発病葉率は「富有」2.8%（平年11.5%）、「平核無」・「刀根早生」0.4%（平年2.2%）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 病原菌は葉裏の気孔から侵入するので、葉裏に丁寧に薬液を散布する。
- ② 一般に盛夏期の発病は一時休止するが、山間部や風通しの悪い園地は発病を繰り返しやすいので、これらの園地では秋雨前の予防散布に努める。

3. 円星落葉病

(1) 予報内容 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

- ① 県北部における前年10月の「富有」での発生園率は35%（平年39%）、発病葉率は0.6%（平年5.1%）であった。
- ② 8月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 樹勢が低下すると発病が助長されるため、適切な肥培管理や水分管理を心がけ樹勢維持に努める。
- ② 子のう胞子の飛散が続く8月上旬まで防除が必要である。

4. 角斑落葉病

(1) 予報内容 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

- ① 県北部における前年10月の「富有」での発生園率は77%（平年77%）、発病葉率は8.2%（平年17.4%）であった。
- ② 8月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 樹勢が低下すると発病が助長されるため、適切な肥培管理や水分管理を心がけ樹勢維持に努める。
- ② 本病は7月頃から発病し二次伝染を繰り返すので、多発園では発病後も防除を励行する。

5. フジコナカイガラムシ

(1) 予報内容 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

- ① 県北部における7月中旬の発生園率は、「富有」35%（平年70%）、「平核無」・「刀根早生」0%（平年27%）であった。
- ② 県北部における7月中旬の寄生果率は、「富有」2.2%（平年8.5%）、「平核無」・「刀根早生」0%（平年1.2%）であった。
- ③ 8月の気象予報による。

(3) 防除上注意すべき諸点

- ① 県予察ほ場（無防除、紀の川市粉河）における近年の第2世代ふ化幼虫の初発は7月21～27日頃であり、次回の防除適期は8月上旬頃と予想される。
- ② 枝葉の混み合いをなくし、薬液が果実に十分かかるよう丁寧に散布する。

<果樹全般>

1. カメムシ類

(1) 予報内容 発生量 少

(2) 予報の根拠

- ① 予察灯による7月中旬のチャバネアオカメムシ成虫の誘殺数は、紀の川市粉河で65頭（平年215.8頭）、有田川町奥で49頭（過去3年の平均796.7頭）、みなべ町東本庄で63頭（過去7年の平均536.4頭）であった。
- ② 予察灯による7月中旬のツヤアオカメムシ成虫の誘殺数は、紀の川市粉河で3頭（平年53.3頭）、有田川町奥で3頭（過去3年の平均125.0頭）、みなべ町東本庄で32頭（過去7年の平均190.3頭）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 果樹カメムシ類の飛来量は園地間差が大きく、特に山林隣接園では早くから被害が出やすい。
- ② 園内での果樹カメムシ類の発生及び被害状況をよく観察し、防除は発生に応じて早めに行う。
- ③ 今後の発生動向については、農業環境・鳥獣害対策室ウェブページ内農作物病害虫防除所コーナーの果樹カメムシ情報や、各地域の振興局農業水産振興課、JA等の情報を参考にする。

本情報は、下記の方法でもご覧頂けます。

○農業環境・鳥獣害対策室ウェブページ <農作物病害虫防除所コーナー>

[http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070300/071400/
boujyosyo-yosatsujiyouhou.html](http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070300/071400/boujyosyo-yosatsujiyouhou.html)

○和歌山県ホームページ <わかやま県政ニュース>

<http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/>

※詳しくは、農作物病害虫防除所(TEL 0736-64-2300)までお願いします。