

# ⚠️ 果樹カメムシ大量発生中

## 防除を徹底してください！



チヤバネアオカメムシ



ツヤアオカメムシ




クサギカメムシ

カメムシは、夏に山のスギ・ヒノキの実を食べて繁殖し、秋に世代交代を迎えます。今カメムシが見られない園地でも、秋に生まれたカメムシが山から園地へ飛来し、果実を加害する可能性があります。

園内をこまめに見回り、カメムシの早期発見に努めましょう！

**平年の約4倍**



和歌山市・海南市・紀美野町に仕掛けたトラップによるカメムシ捕獲状況

令和6年8月  
和海地方総合農政推進協議会

# カメムシ防除は早期に発見、即対応!!

## 対策方法

- 園内をこまめに見回り、カメムシ発生の早期発見に努めましょう
- 発生が認められた場合は、速やかに薬剤散布を行いましょ
- 山林に近いほ場では被害が出やすい傾向があるため、特に注意してください
- 日没前後の飛来が多いので夕方の薬剤散布が効果的です
- 農薬の使用基準を守りましょう（特に総使用回数に注意してください）

## ・カメムシに登録のある薬剤（抜粋） その他登録薬剤については下記QRコードへ

適用作物	薬剤名	希釈倍率	収穫前日数/使用回数
かき	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	前日まで /3回以内
	モスピラン顆粒水溶剤	2000~4000倍	前日まで /3回以内
	アグロスリン水和剤	1000~2000倍	前日まで /3回以内
	キックオフ顆粒水和剤	2000倍	前日まで /3回以内
	キラップフロアブル	2000倍	7日前まで /2回以内
かんきつ	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	前日まで /3回以内
	ダントツ水溶剤	2000~4000倍	前日まで /3回以内
	ロディー乳剤	2000倍	7日前まで /4回以内
	アグロスリン水和剤	2000倍	7日前まで /3回以内
	エルサン乳剤	1000倍	14日前まで /2回以内
キウイフルーツ	スタークル顆粒水溶剤	1000~2000倍	前日まで /3回以内
	ダントツ水溶剤	2000~4000倍	前日まで /3回以内
	アディオン乳剤	2000倍	7日前まで /5回以内

登録内容：令和6年8月8日現在

詳しくは海草振興局農業水産振興課またはJAにご相談ください

和歌地方総合農政推進協議会事務局  
海草振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒640-8585  
和歌山市小松原通1丁目1番地（県庁第2南別館）  
TEL：073-441-3378 FAX：073-441-3476

トラップ設置場所等の詳細、  
最新の発生状況はこちら→  
(海草振興局webサイト)

