

種類		※接種対象年齢		標準的な接種期間	回数	間隔	備考
BCG		生後12ヶ月未満		生後5ヶ月～8ヶ月までの期間	1回		
ポリオ	4種混合 (DTP-IPV)	1期初回	生後3ヶ月～90ヶ月未満	生後3ヶ月～18ヶ月未満	3回	20日から56日間隔を空ける	
		1期追加	生後3ヶ月～90ヶ月未満(初回接種終了後、6月以上間隔を空ける)	初回接種終了後12ヶ月～18ヶ月までの期間	1回		
ジフテリア	3種混合	1期初回	生後3ヶ月～90ヶ月未満	生後3ヶ月～12ヶ月未満	3回	20日から56日間隔を空ける	
		1期追加	生後3ヶ月～90ヶ月未満(初回接種終了後、6月以上間隔を空ける)	1期初回接種(3回)終了後、12ヶ月～18ヶ月に達するまでの期間	1回		
百日咳	(DTP)	1期追加	生後3ヶ月～90ヶ月未満(初回接種終了後、6月以上間隔を空ける)	1期初回接種(3回)終了後、12ヶ月～18ヶ月に達するまでの期間	1回		
破傷風	2種混合 (DT)	2期	11歳～13歳未満	11歳～12歳未満	2回	20日から56日間隔を空ける	
麻しん・風しん	混合(MR)	1期	生後12ヶ月以上～生後24ヶ月未満		1回		
		2期	5歳以上～7歳未満で、小学校就学前の1年間		1回		
日本脳炎		1期初回	生後6ヶ月～90ヶ月未満	3歳～4歳未満	2回	6日から28日間隔を空ける	
		1期追加	生後6ヶ月～90ヶ月未満(1期初回接種のおおむね1年空ける)	4歳～5歳未満	1回		
		2期	9歳以上～13歳未満	9歳～10歳未満	1回		
		65歳以上					

種類	※接種対象年齢		標準的な接種期間	回数	間隔	備考
インフルエンザ	60歳以上、65歳未満で、次の方が該当		(心臓、腎臓、又は呼吸器の機能に自己の身の辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方)	(毎年度)1回		※自己負担分があります!(地域により負担額が違いますので市町村へお問い合わせください)
Hib感染症	①生後2ヶ月～7ヶ月未満	生後12ヶ月まで	初回3回	27日から56日間隔を空ける		
		生後12ヶ月～15ヶ月	追加1回	初回接種終了後から1年後		
	②生後7ヶ月～1歳未満	生後12ヶ月まで	初回2回	27日から56日間隔を空ける		
		生後12ヶ月以降	追加1回	初回接種終了後から1年後		
	③1歳～2歳未満		2回	60日以上間隔を空ける		
	④2歳～5歳未満		1回			
小児肺炎球菌	初回	生後2ヶ月～7ヶ月	生後12ヶ月までに	3回	27日以上の間隔を空ける	
	追加	初回接種終了後60日以上間隔を空ける	生後12ヶ月～15ヶ月	1回		
水痘	初回		生後12ヶ月～15ヶ月	1回		任意接種として水痘ワクチン接種を受けたことのあるお子さんは、接種した回数分の接種を受けたものとみ
	2回目		初回から6ヶ月～12ヶ月の間隔を空ける	1回		
ヒトパピローマウィ	①2価HPVワクチンの場合		13歳になる年度の初日からその年度の末日	3回	1ヶ月の間隔をおいて2回打った後、1回目の注射から6ヶ月の間隔をおいて1回	同一のお子さんには同一のワクチンを使

種類	※接種対象年齢		標準的な接種期間	回数	間隔	備考
ルス(HPV)感染症	②4価 HPVワクチン の場合		13歳になる年度の初日からその年度の末日	3回	2ヶ月の間隔をおいて2回打った後、1回目の注射から6ヶ月の間隔をおいて1回	ノックアウトを使用するようにしてください。
B型肝炎	1歳未満の小児		生後2ヶ月から9ヶ月未満	3回	27日以上の間隔をおいて2回打った後、1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回	平成28年4月1日以降に生まれたお子さん全てが対象となります。