


<地域ぐるみの取り組み>

- ① 発病株を発見した場合は、根から引き抜き直ちに地中に埋めるか、ビニール袋等で密封して枯死させて下さい。
- ② キュウリ等他作物においてもシルバーリーフコナジラミを多発させないように注意するとともに、コナジラミの住みかとなる圃場周辺の雑草の除去を徹底して下さい。

<施設栽培での取り組み>

- ① 防虫ネット（目合い0.4mm以下）の設置
 - ・施設開口部全てを被覆して下さい。
 - ※高温時は寒冷紗による遮光や循環扇の利用により、温度上昇がやや緩和されます。
- ② 育苗初期～生育初期の薬剤散布
 - ・散布剤は即効性のものを中心にローテーション散布し、シルバーリーフコナジラミの徹底防除に努めて下さい。
 - ・鉢上げ時の粒剤処理。
 - ・定植時または育苗期後半の粒剤処理（必須）。
- ③ 生育中期～後期の薬剤散布
 - ・シルバーリーフコナジラミを低密度に管理するため、黄色粘着シートへのコナジラミの付着を目安に薬剤散布を行って下さい。ラノーテープ剤の利用も有効です。
- ④ 収穫終了時の保毒したシルバーリーフコナジラミ分散防止
 - ・収穫終了株を地際で切断し、施設を10日間程度密閉してシルバーリーフコナジラミを死滅させて下さい。

施設栽培での防除体系



●お問い合わせ先●

和歌山県農林水産部エコ農業推進室	TEL 073-432-4111 (代表)
和歌山県農林水産総合技術センター農業試験場	TEL 0736-64-2300 (代表)
海草振興局農業普及課	TEL 073-432-4111 (代表)
那賀振興局農業普及課	TEL 0736-63-0100 (代表)
伊都振興局農業普及課	TEL 0736-34-1700 (代表)
有田振興局農業普及課	TEL 0737-63-4111 (代表)
日高振興局農業普及課	TEL 0738-22-3111 (代表)
西牟婁振興局農業普及課	TEL 0739-22-1200 (代表)
東牟婁振興局農業普及課	TEL 0735-25-8551 (代表)